

ESCAPAD 2005

Exploitation départementale :

Saône-et-Loire

Méthodologie de l'enquête :

Mise en oeuvre par l'OFDT en partenariat avec la Direction du service national (DSN), l'enquête déclarative ESCAPAD¹ consiste en un questionnaire proposé à l'ensemble des jeunes présents lors d'une Journée d'appel de préparation à la défense (JAPD). Elle renseigne sur les niveaux d'usage et les tendances émergentes en termes de produits et de modalités de consommation et offre un suivi très réactif des évolutions à un âge particulièrement concerné. Elle présente, par ailleurs, l'avantage d'interroger un échantillon représentatif de tous les jeunes Français (hommes et femmes), y compris ceux qui sont déscolarisés ou qui travaillent. Cette enquête a été étendue aux Dom en 2001 et aux Com (Polynésie Française et Nouvelle-Calédonie uniquement) en 2003.

En métropole, l'échantillon exploitable lors de l'enquête 2005 atteint 29 393 adolescents de 17 ans (en âge révolu, c'est-à-dire en tenant compte du mois de naissance).

Présentation des indicateurs utilisés et lecture des tableaux :

L'étude des usages de produits psychoactifs nécessite de choisir les indicateurs de niveau et de fréquence d'usage supposés illustrer les consommations de la façon la plus pertinente possible. Dans l'analyse proposée, nous avons retenu les principaux indicateurs utilisés dans les rapports des enquêtes ESCAPAD depuis 2000 et adoptés généralement dans les études internationales :

- L'expérimentation qui désigne le fait de déclarer avoir déjà pris un produit au cours de sa vie, quel que soit le nombre de consommations ;
- L'usage récent qui désigne l'usage au cours des trente derniers jours ;
- L'usage régulier, qui désigne le fait de déclarer avoir pris au moins dix fois un produit au cours des trente derniers jours, à l'exception du tabac, pour lequel il s'agit de l'usage quotidien ;
- L'usage quotidien, qui désigne le fait d'avoir pris un produit quotidiennement au cours des trente derniers jours.

Pour l'ivresse alcoolique, ont également été distingués :

- L'ivresse au cours de la vie ;
- L'ivresse répétée, qui désigne le fait de déclarer avoir été ivre au moins trois fois durant les douze derniers mois ;

Les tableaux présentés dans cette analyse départementale donnent les fréquences d'usage pour ces différents indicateurs dans le département, pour la région de celui-ci et pour l'ensemble de la métropole.

Le test utilisé est celui du Chi-2². Les symboles *, ** et *** signifient que l'écart est significatif (test du Chi-2) respectivement au seuil 0.05, 0.01, 0.001 pour la comparaison des sexes dans le département (colonne « *sex ratio* »), pour la comparaison du niveau départemental avec celui du reste de la région et du reste de la métropole (colonnes « Test Dép » correspondantes) et pour la comparaison du niveau régional avec celui des autres régions (colonne « Test Reg »). *A contrario*, « ns » signifie non significatif.

Enfin, pour les colonnes concernant le département et la région, la taille des échantillons n'offre pas une précision de la mesure suffisante pour conserver la décimale, contrairement à l'échantillon métropolitain.

¹ Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l'Appel de Préparation À la Défense

² Dans certains cas où les conditions de validité du Chi-2 ne sont pas remplies, c'est le test du Chi-2 avec correctif de Yates qui est utilisé. Dans le cas où les effectifs sont très faibles, il peut arriver aussi qu'aucun test ne soit effectué (nd).

Les consommations de produits psychoactifs à 17 ans en Saône-et-Loire :

	Saône-et-Loire				Bourgogne		Métropole				
	Garçons	Filles	Ensemble	Sex ratio	Ensemble	Test Dép	Garçons	Filles	Ensemble	Test Dép	Test Reg
Taille des échantillons	184	168	352		985		14935	14458	29393		
Expérimentation de tabac (%)	73	67	70	ns	74	ns	71,0	73,5	72,2	ns	ns
Usage quotidien de tabac (%)	41	35	38	ns	40	ns	33,6	32,3	33,0	ns	***
Usage récent d'alcool (%)	86	79	83	ns	84	ns	82,0	75,3	78,7	ns	***
Usage régulier d'alcool (%)	27	8	18	***	16	ns	17,7	6,1	12,0	***	***
Ivresse au cours de la vie (%)	72	50	61	***	61	ns	63,3	49,6	56,6	ns	**
Ivresses répétées (%)	41	20	31	***	30	ns	33,4	18,3	26,0	*	**
Expérimentation de cannabis (%)	54	40	47	*	51	ns	53,1	45,5	49,4	ns	ns
Usage régulier de cannabis (%)	16	6	11	**	13	ns	15,0	4,1	10,8	ns	**
Exp. de médicaments psychotropes (%)	12	30	21	***	22	ns	11,3	28,6	19,9	ns	ns
Exp. de champignons hallucinogènes (%)	6	2	4	ns	3	ns	5,2	2,1	3,7	ns	ns
Expérimentation de poppers (%)	14	11	13	ns	7	***	6,3	4,8	5,5	***	ns
Expérimentation d'ecstasy (%)	6	4	5	ns	5	ns	4,2	2,8	3,5	ns	**
Expérimentation de cocaïne (%)	2	1	2	nd	2	ns	3,0	2,0	2,5	ns	ns
Expérimentation d'héroïne (%)	1	2	1	nd	1	ns	0,8	0,6	0,7	nd	ns

Source : Escapad 2005, exploitation Saône-et-Loire, OFDT

Synthèse régionale :

Par rapport aux autres régions métropolitaines, la Bourgogne apparaît particulièrement consommatrice de tabac, d'alcool et de cannabis .

Synthèse départementale :

Sur les 4 départements que compte la région Bourgogne, l'analyse est possible sur 1.

Par rapport au reste de la Bourgogne, la Saône-et-Loire présente un profil moyen de consommation, à l'exception de l'expérimentation de Poppers, qui apparaît beaucoup plus élevée que la moyenne régionale et même nationale. Ce résultat surprenant demande à être confirmé par des mesures ultérieures ou des observations de terrain. Le cas est rare mais pas isolé, comme en témoigne les mesures relevées en Haute-Vienne.

Globalement, la région Bourgogne étant plus consommatrice que la moyenne, le département présente un profil légèrement sur-consommateur d'alcool par rapport au reste de la métropole.