



Les addictions dans l'Yonne

Estimation du nombre de consommateurs de substances psychoactives en France métropolitaine parmi le 12-75 ans

	Produits illicites				Produits licites	
	Cannabis	Cocaïne	Ecstasy	Héroïne	Alcool	Tabac
Expérimentateurs	12,4 M	1,1 M	900 000	360 000	45,5 M	35,8 M
dont usagers dans l'année	3,9 M	250 000	200 000	//	39,4 M	14,9 M
dont usagers réguliers	1,2 M	//	//	//	9,7 M	11,8 M
dont usagers quotidiens	550 000	//	//	//	6,4 M	11,8 M

// : non disponible - NB : le nombre d'individus de 12-75 ans en 2005 est d'environ 46 millions.

Ces chiffres sont des ordres de grandeur et doivent de ce fait être lus comme des données de cadrage. En effet, une marge d'erreur existe même si elle s'avère raisonnable. Par exemple, 12,4 millions d'expérimentateurs de cannabis signifie que le nombre d'expérimentateurs se situe vraisemblablement entre 12 et 13 millions. Sources : OFDT

Consommations régulières de cannabis, d'alcool et de tabac suivant l'âge et le sexe (en %)

	17 ans		18 - 75 ans					Hommes	Femmes	Ensemble
	Garçons	Filles	17 ans	18-25 ans	26-44 ans	45-64 ans	65-75 ans			
Cannabis	15	6,3	10,8	8,7	2,5	0,2	-	3,7	1	2,3
Alcool	17,7	6,1	12	8,9	13,6	29,8	45,1	33,4	12,1	22,5
Tabac	33,6	32,3	33	36,2	33,5	21,6	7,9	30,3	22,9	26,5

Expérimentations de tabac, d'alcool, de cannabis suivant le sexe et l'âge (%)

		Garçons		Filles		Sex ratio	Ensemble
		11 ans	13 ans	11 ans	13 ans		
Alcool	11 ans	64	54	1,2***	59		
	13 ans	74	71	1,0 ns	72		
	15 ans	84	83	1,0 ns	84		
Tabac	11 ans	10	5	1,9***	8		
	13 ans	30	29	1,1 ns	29		
	15 ans	52	57	0,9*	55		
Ivresse	11 ans	9	4	2,3***	6		
	13 ans	17	14	1,2 ns	16		
	15 ans	44	38	1,2**	41		
Cannabis	11 ans	1	1	2 ns	1		
	13 ans	5	4	1,3 ns	5		
	15 ans	30	25	1,2*	28		

Lecture : *, **, *** et ns : test du chi-2 pour la comparaison des sexes, significatif respectivement au seuil 0.05, 0.01, 0.001 et non significatif. Ratio 1 et 2 : rapport des niveaux entre générations. Source : HBSC 2006, exploitation OFDT

Ce document présente les **principaux indicateurs disponibles sur les addictions en Bourgogne et dans l'Yonne**. Ils sont tirés de la réalisation CIRDD-ORS Bourgogne intitulée Les addictions en Bourgogne.

Les points particuliers :

- La hausse du tabagisme quotidien chez les jeunes
- La surmortalité générale par cancer du poumon et cardiopathies ischémiques chez les hommes
- La surmortalité par cardiopathies ischémiques chez les femmes
- La hausse de la mortalité par cancer du poumon chez les femmes
- 17% des hommes et 3% des femmes de la région présenteraient un risque d'alcoolisation excessive et/ou de dépendance à l'alcool
- L'usage d'alcool chez les jeunes
- La surmortalité générale et prématurée masculine par cirrhose
- L'usage régulier de cannabis
- La consommation de tranquillisants, antidépresseurs et somnifères des adultes et des jeunes filles
- L'expérimentation d'ecstasy
- Les niveaux élevés de Subutex® et de méthadone délivrés



TABAC

Consommation



Adultes

En 2005, la proportion de fumeurs en Bourgogne est proche de la moyenne nationale : 34% des hommes et 28% des femmes bourguignonnes de 18-75 ans déclarent fumer, ne serait-ce que de temps en temps¹.



Jeunes²

En 2005, le tabagisme quotidien à 17 ans concerne 40% des jeunes en Bourgogne. Ce taux est bien supérieur à la moyenne nationale et en hausse par rapport à 2002-2003.

Prise en charge et conséquences sanitaires

Décès liés au tabagisme dans **l'Yonne : 600 décès par an**, dont 18% surviennent avant l'âge de 65 ans (qualifiés de "prématurés").

L'Yonne se distingue par une **surmortalité générale par cancer du poumon et cardiopathies ischémiques chez les hommes, et une surmortalité par cardiopathies ischémiques chez les femmes**.

Le taux de mortalité associé au tabagisme a globalement diminué depuis 25 ans, dans l'Yonne. Cependant, **le fait marquant de ces deux dernières décennies est l'augmentation de la mortalité par cancer du poumon chez les femmes**, celle-ci restant toutefois bien inférieure à celle des hommes³.

Conséquences judiciaires

En 2006, les Douanes ont saisi lors de 24 constatations, 57 kg de tabac sur le territoire bourguignon⁴. Il peut s'agir d'une découverte de tabac au cours d'une saisie d'autres produits ou d'une saisie ciblée.

Offre

Dans l'Yonne, on compte 96 débits de tabac pour 100 000 habitants de 16 ans ou plus⁴.

En 2007, concernant les ventes de tabac, **l'Yonne se distingue par un niveau de vente plus élevé** (1 022 cigarettes par habitant). C'est **le deuxième taux le plus élevé de la région** après la Nièvre, supérieur au taux national. La tendance à la baisse est toutefois identique dans les 4 départements bourguignons, avec une légère reprise depuis 2004.



ALCOOL

Consommation



Adultes¹

Les usages d'alcool des bourguignons sont **proches de la moyenne nationale**. Évalués à partir du questionnaire DETA, les usages à risque des Bourguignons âgés de 18 à 75 ans ne se distinguent pas significativement de la moyenne nationale. Ainsi 17% des hommes et 3% des femmes de la région présenteraient un risque d'alcoolisation excessive et/ou de dépendance à l'alcool.

Jeunes

Par rapport au reste de la France, **les jeunes bourguignons déclarent davantage un usage régulier d'alcool** (16% contre 12% au niveau national) ainsi que des ivresses répétées (30% contre 26%)².



Les jeunes bourguignons sont plus nombreux à déclarer avoir conduit un véhicule après avoir bu plus d'un verre d'alcool, au cours de l'année (16% contre 12,2% au niveau national).

Ils se caractérisent également par une consommation plus fréquente de vin que la moyenne nationale⁶.

Prise en charge et conséquences sanitaires

Près de 1300 personnes ayant un problème avec l'alcool sont venues consulter dans les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) de l'Yonne en 2006, soit 6 personnes pour 1 000 habitants de 20 à 70 ans (taux supérieur à la moyenne nationale qui est de 3,2). **Le département présente des taux supérieurs** aux taux régionaux et nationaux.⁷

Le département présente des taux supérieurs aux taux régionaux et nationaux. Dans l'Yonne, on observe en moyenne près de **140 décès annuels** directement associés à la consommation d'alcool, dont près de **60% surviennent avant l'âge de 65 ans** (moyenne annuelle 2003-2005).

La mortalité directement associée à la consommation d'alcool diminue depuis plus de vingt ans, pour les hommes comme pour les femmes. **Cependant l'Yonne présente une surmortalité générale et prématurée masculine par cirrhose**³.

En 2005, **346 patients** ont été hospitalisés en soins de courte durée liés à l'alcool dans l'Yonne⁸.

En 2008, la préfecture a constaté **61 accidents corporels avec alcool, dont 12 mortels**, sur les routes de l'Yonne. Dans le département, cette même année, l'alcool était présent dans 14,5% des accidents corporels et dans 31,6% des accidents mortels¹⁷.

Conséquences judiciaires

En 2007, on a constaté dans l'Yonne :

- **631 interpellations pour ivresse manifeste sur la voie publique** (soit 29,6 pour 10 000 habitants de 20 à 70 ans). **Le département enregistre des taux d'interpellations supérieurs** à ceux de la région et de la métropole¹⁰.

En 2008 :

- près de **128 500 dépistages** de l'alcoolémie pratiqués, dont 1,7% positifs⁹.

En 2006, les Douanes ont saisi 16 934 litres d'alcool lors de 6 constatations sur le territoire bourguignon⁴.

Offre

En 2002, l'Yonne comptait 310 débits de boissons pour 100 000 habitants de 15 ans et plus. Ce taux est inférieur à la moyenne régionale (357) mais identique à la moyenne nationale (309)⁴.



CANNABIS

Consommation

Adultes

Les usages de cannabis des adultes bourguignons sont **inférieurs à ceux observés au niveau national**. Parmi les 15-64 ans, 2% sont des consommateurs réguliers¹.

Jeunes

En Bourgogne, 51% des jeunes de 17 ans ont expérimenté le cannabis et ils sont 13% à en consommer régulièrement². L'usage régulier apparaît supérieur à celui observé sur l'ensemble du territoire métropolitain.



Prise en charge et conséquences sanitaires

Le cannabis, produit illicite le plus consommé, est facteur de risque d'accidents.

Sa consommation chronique peut induire une humeur dépressive, des troubles intellectuels et la désocialisation. Il a des conséquences respiratoires et cardiovasculaires, indépendantes mais voisines de celles du tabac, avec lequel il est souvent fumé.

Dans l'Yonne, le nombre moyen de personnes vues dans les 2 consultations cannabis est passé de 10,9 à 10,5 de mars 2005 à décembre 2007¹¹.

Conséquences judiciaires

De 1997 à 2007, **le taux d'interpellation pour usages de cannabis dans l'Yonne a légèrement augmenté**. En France, ce taux a fortement augmenté pendant la même période. Les taux sont proches de la moyenne régionale et **plus bas que la moyenne nationale**.

Depuis 2004, les interpellations d'usagers-revendeurs et de trafiquants de cannabis sont stables dans le département.

Les saisies de cannabis sont stables depuis 2004 avec une légère baisse en 2007¹².



AUTRES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES

Consommation

Adultes

Parmi les 18-64 ans, 1% des Bourguignons a expérimenté l'ecstasy et 2% la cocaïne¹. La consommation de tranquillisants, antidépresseurs et somnifères (probablement en majorité sur prescription médicale) est fréquente (respectivement 8,3%, 7,9% et 5,3% chez les adultes de 18-64 ans dans l'année, en région)¹.

Jeunes²

Parmi les jeunes bourguignons, 5% ont expérimenté l'ecstasy et 2% la cocaïne. L'expérimentation de produits illicites autres que le cannabis est proche de la moyenne nationale, **à l'exception de l'ecstasy qui s'avère plus expérimenté dans la région** (3,5% au niveau national).

En Bourgogne, **l'expérimentation de médicaments psychotropes est fréquente chez les jeunes filles de 17 ans : 31% en ont déjà consommé.**



Prise en charge et conséquences sanitaires

Les surdoses aux produits illicites sont devenues rarissimes depuis la politique de réduction des risques (**entre 0 à 1 par an ces dernières années dans l'Yonne**)¹³. La proportion de maladies infectieuses chroniques (VIH/virus de l'hépatite C) diminue parmi les personnes toxicomanes depuis les années 90. La prévalence de l'hépatite C reste cependant élevée (estimée à 23% pour les toxicomanes pris en charge dans des établissements sanitaires et 28% dans les établissements spécialisés, en Bourgogne)¹⁴.

De 1997 à 2003, les **taux de recours des toxicomanes au système médico-social** ont augmenté puis diminué pour enregistrer, en 2003, un taux très faible, inférieur aux niveaux régional et national¹⁴.

L'Yonne est le seul département bourguignon dont **les ventes de Stéribox® ont diminué de 2000 à 2007**. Pendant la même période, les ventes sont stables en France¹⁵. Dans le département, en 2008, **12 600 seringues ont été échangées**, soit 16,3 pour 100 habitants de 20 à 39 ans (taux très faible par rapport aux autres départements bourguignons)¹⁶. En additionnant les seringues échangées et celles vendues dans les Stéribox®, on compte près de **32 200 seringues distribuées** dans l'Yonne, en 2007 (les données 2008 des Stéribox® ne pas encore disponibles). Si on rapporte ces effectifs à la population, l'Yonne se distingue par le plus faible taux de seringues distribuées de la région.

Les quantités de Subutex® délivrées n'ont cessé de diminuer de 2000 à 2007 dans l'Yonne. En 2000, le département enregistrait un taux très élevé de prescriptions de Subutex® et en 2007, les taux sont proches des moyennes régionale et nationale¹⁵. Par contre, **les quantités de Méthadone délivrées** n'ont cessé d'augmenter depuis 2000, en France, comme dans l'Yonne. L'Yonne présente toujours des **taux bien supérieurs à la moyenne nationale** : 39,7 flacons délivrés pour 100 personnes de 20 à 39 ans en France contre 79,2 dans l'Yonne¹⁵.

Conséquences judiciaires

Mise à part en 1997 où le **taux d'interpellation des usagers d'héroïne, de cocaïne et d'ecstasy (pour 10 000 habitants de 20 à 39 ans) est très élevé dans l'Yonne**, le département enregistre des **taux stables et plus faibles que ceux du niveau national**.

Mise à part l'année 2007 où un réseau de trafiquants d'héroïne a été démantelé, les interpellations d'usagers-revendeurs et de trafiquants sont stables depuis 2007¹².



REPERES METHODOLOGIQUES

Sources utilisées

- 1 Baromètre Santé 2005, INPES, exploitation ORS Bourgogne
- 2 ESCAPAD 2005, Enquête sur la santé et les consommations lors de la journée d'appel et de préparation à la défense (Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)/Direction centrale du service national (DCSN))
- 3 Inserm CépiDC, Insee, exploitation FNORS, 2003-2005
- 4 Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, Direction Régionale des Douanes de Bourgogne
- 5 Centre de Documentation et d'Information sur le Tabac, Insee
- 6 INPES, OFDT, Atlas régional des consommations d'alcool, 2005
- 7 Indicateurs ILIAD, OFDT, Direction générale de la santé, ministère de l'Emploi et de la Solidarité, Rapports d'activité des Centres de cure ambulatoire en alcoologie, 2006
- 8 Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation (PMSI) 2005, exploitation ORS
- 9 Préfecture de l'Yonne (zone police et gendarmerie), exploitation CIRDD, 2008
- 10 Indicateurs ILIAD, OFDT, Direction Générale de la Police nationale, Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, 2007
- 11 SIMCCA, OFDT, mars 2005 à septembre 2007
- 12 Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants, 1997-2007
- 13 FNORS, Scores Santé
- 14 DREES, Enquête du mois de novembre sur la prise en charge des toxicomanes dans les structures médicosociales (recours recensés durant le mois de novembre et suivant le département de domicile des usagers), 2003
- 15 Indicateurs ILIAD, OFDT, SIAMOIS (Système d'information sur l'accessibilité au matériel officinal d'injection stérile). InVS, 2000-2007
- 16 Rapports d'activités des CCAA, exploitation CIRDD, 2008
- 17 DDE de l'Yonne, exploitation CIRDD 2008

Définitions

Expérimentation : au moins un usage au cours de la vie

Usage au cours de l'année : une consommation au moins au cours de l'année ; pour le tabac, il s'agit des personnes déclarant fumer ne serait ce que de temps en temps

Usage régulier : au moins trois consommations d'alcool dans la semaine ; tabagisme quotidien ; usage de somnifères ou tranquillisants dans la semaine ; dix consommations de cannabis dans le mois

Usage quotidien : au moins une fois par jour

Ivresse répétée : désigne le fait de déclarer avoir été ivre au moins trois fois durant les douze derniers mois

Binge drinking : consommation de cinq verres d'alcool ou plus, en une seule occasion



Rédaction : CIRDD Bourgogne

30 boulevard de Strasbourg - 21000 Dijon - Tél. : 03 80 68 27 21 -

Fax : 03 80 68 27 20 - contact@cirddbουργogne.fr - <http://www.cirddbουργogne.fr>